



QUALI-PRO



# PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG

FONGICIDE POUR GAZON

L'utilisation de PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG vous permet de contrôler efficacement les maladies afin de maximiser vos investissements dans votre programme de gestion de la moisissure des neiges.



## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Fongicide polyvalent offrant un contrôle efficace de la moisissure des neiges et des plaques brunes
- Contrôle à long terme de la moisissure des neiges. Les essais de recherche ont montré d'excellents résultats même après plus de 150 jours d'enneigement
- Meilleur produit au classement du rapport Rutgers – Chemical Control of Turfgrass Diseases 2020 (contrôle chimique des maladies du gazon 2020)
- Le traitement contre la moisissure des neiges ne nécessite qu'un faible taux d'utilisation – 15 g/100 m<sup>2</sup> ou 1,5 kg/ha
- Un contenant permet de traiter deux hectares ou cinq acres

### Types de gazon

Toutes les graminées de saison fraîche présentes sur les terrains de golf, y compris les agrostides, les pâturins, les fétuques, les ivraies vivaces et leurs mélanges.

### Fonctionnement

PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG est un fongicide protecteur pour lutter contre les maladies du gazon suivantes : les plaques brunes, la moisissure rose des neiges et la moisissure grise des neiges lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un programme intégré de gestion préventive des maladies.

### Lutte contre la maladie

- Plaque brune
- Moisissure grise des neiges (*Typhula incarnata*)
- Moisissure rose des neiges (*Microdochium nivale*)

### Matière active

Fludioxonil

### Même matière active que dans

Medallion<sup>MD</sup>

### Formats

Bidon de 3 kg (4 bidons de 3 kg par caisse)

### Mode d'action

Fongicide de contact, inhibe la germination, la croissance et le développement des spores.

### Groupe

Groupe 12 du FRAC

### Entreposage

Entreposer dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.



# PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG

## Dose d'application

De 7,5 à 15 g sur 100 m<sup>2</sup>

## Directives d'application

L'application est justifiée lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie. Poursuivre l'application tant que ces conditions persistent et dans les limites indiquées ci-dessous.

1. UTILISER PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG COMME PULVÉRISATION FOLIAIRE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME INTÉGRÉ DE GESTION PRÉVENTIVE DES MALADIES.
2. Appliquer un maximum de 45 g/100 m<sup>2</sup> par saison pour le contrôle des plaques brunes et de 15 g/100 m<sup>2</sup> pour le contrôle de la moisissure des neiges.
3. Appliquer dans une quantité d'eau suffisante pour assurer un recouvrement complet.
4. Appliquer après la tonte.
5. Pour lutter contre les maladies foliaires, laisser sécher complètement la zone pulvérisée avant de l'irriguer.
6. Dans des conditions favorisant le développement optimal de la maladie, employer la dose supérieure et l'intervalle de pulvérisation le plus rapproché.
7. Pour une qualité de gazon idéale et un contrôle optimal des maladies, intégrer le PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG à vos pratiques de gestion du gazon qui favorisent une bonne santé des plantes et une lutte efficace contre les maladies.
8. Avant d'utiliser un fongicide, il est important de diagnostiquer correctement l'organisme responsable de la maladie. L'utilisation de trousses de diagnostic ou d'autres outils pour identifier la maladie est essentielle pour déterminer les meilleures mesures de contrôle à employer.

## Directives pour cibler une maladie en particulier

**Moisissure grise des neiges (*Typhula incarnata*)**

**Moisissure rose des neiges (*Microdochium nivale*)**

· DOSE (100 m<sup>2</sup>) 15 g (1,5 kg/ha)

Appliquer PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG une fois entre la mi-octobre et la fin de novembre avant que la neige ne couvre le sol. Ne pas appliquer sur la neige ni quand la température est inférieure à 0 °C. Ne pas appliquer plus d'une (1) fois par saison.

**Plaque brune (*Rhizoctonia solani*)**

· DOSE (100 m<sup>2</sup>) 6 à 7,5 g (0,6 à 0,75 kg/ha) à intervalles de sept jours

· DOSE (100 m<sup>2</sup>) 15 g (1,5 kg/ha) à intervalles de 14 jours

Commencer les traitements lorsque les conditions sont propices à une infection pathogène et avant l'apparition de symptômes de maladies. Ne pas faire plus de deux traitements consécutifs de PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG ou d'autres fongicides du Groupe 12 avant de passer à un fongicide ayant un mode d'action différent.

## Mélanges de Fludioxonil 50 WDG en cuve

Des essais de recherche ont montré qu'un mélange composé de PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG et de propiconazole Quali-Pro est très efficace. Lire toutes les étiquettes et prendre les précautions nécessaires en respectant à la lettre les consignes s'appliquant aux produits mélangés en cuve.

Le PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG est habituellement compatible avec de nombreux fongicides, insecticides et nutriments foliaires courants. Toutefois, la compatibilité physique du PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG mélangé en cuve avec d'autres produits inconnus devrait être vérifiée avant son utilisation. Pour déterminer la compatibilité physique du PENDANT<sup>MC</sup> 50 WDG avec d'autres produits, réaliser un essai en bocal.

Visitez [quali-pro.ca](http://quali-pro.ca) pour plus de renseignements et pour connaître la gamme complète de produits.

