



FONGICIDE

QUALI-PRO



Propiconazole 14.3 ME

FONGICIDE À LARGE SPECTRE POUR GAZON

Grâce à ses propriétés protectrices, curatives et préventives, le Propiconazole 14.3 ME offre un contrôle efficace des dix principales maladies de la tourbe, et ce, même à faible dose.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- La formulation en microémulsion dégage moins d'odeur que les autres mélanges, présente une bonne stabilité en cuve et procure un recouvrement complet des plantes
- Mode d'action systémique local qui assure une protection de longue durée contre la maladie
- Excellent mélange en cuve avec la plupart des autres fongicides

Lutte contre la maladie

Le Propiconazole 14.3 ME Quali-Pro aide à contrôler l'apparition des dix maladies de la tourbe les plus courantes :

- Anthracnose
- Tache des feuilles et fonte helminthosporienne
- Plaque brune
- Moisissure rose des neiges
- Brûlure en plaques
- Fil rouge
- Fusariose froide
- Plaque estivale
- Moisissure grise des neiges
- Rhizoctone ocellé

Fonctionnement

Le Propiconazole 14.3 ME est rapidement absorbé par la plante et transporté dans le xylème par voie acropète. Le Propiconazole 14.3 ME ralentit le développement de la maladie en interférant avec la biosynthèse de stérols dans les membranes des cellules fongiques. L'utilisation du produit lorsque la maladie en est à ses premiers stades de développement permet d'obtenir de meilleurs résultats. Appliquer le Propiconazole 14.3 ME lorsque les conditions sont favorables à l'infection ou à la première apparition des symptômes de la maladie.

Mélanges en cuve tolérés - Pesticides

- Chlorothalonil 720F
- T-NEX^{MD} ME
- PENDANT^{MC} 50 WDG



Formulation

14,3 % microémulsion à base d'eau (154,5 g/L)

Matière active

Propiconazole

Même matière active que dans

Banner Maxx[®]

Formats

2 bidons de 5 L/caisse

Mode d'action

Systémique

Groupe

Fongicide du groupe 3

Entreposage

Entreposer dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. Garder à l'abri du gel.



Propiconazole 14.3 ME

Visitez quali-pro.ca pour plus de renseignements et pour connaître la gamme complète de produits.



Doses d'application

Maladie	Doses de traitement (mL/100 mètres carrés)	Intervalle de traitement/durée de la protection*	Directives
Brûlure en plaques	26 à 51	21 à 28 jours	Appliquer lorsque les jours sont chauds et humides et que les nuits sont fraîches, conditions qui favorisent la formation d'une rosée dense. Une déficience en azote et une sécheresse intense peuvent aussi favoriser la maladie. 1) Le fongicide peut être mélangé en cuve avec le fongicide fluide chlorothalonil QP. OU 2) En alternance avec des fongicides qui ont un mode d'action différent. Ne pas appliquer plus de six (6) fois par saison.
Anthraxnose	26 à 51	21 jours	Appliquer lorsque le temps est chaud et humide. La compaction du sol, un mauvais drainage, l'excès de chaume ou de grandes quantités de <i>Poa annua</i> favorisent le développement de l'anthraxnose. Ne pas appliquer plus de trois (3) fois par saison.
Fil rouge	51	14 jours	Appliquer lorsque le temps est frais et pluvieux. Les périodes prolongées de forte humidité favorisent le développement de la maladie. Ne pas appliquer plus de trois (3) fois par saison.
Plaque brune	51 à 103	14 jours	Appliquer à des fins préventives lorsque les conditions favorisent le développement de la maladie (humidité élevée en surface ou températures nocturnes élevées accompagnées d'humidité). Utiliser une dose supérieure si la maladie est virulente. Ne pas appliquer si les symptômes de la maladie sont déjà présents. Ne pas appliquer plus de six (6) fois par saison.
Tache des feuilles et fonte helminthosporienne	51 à 103	14 jours	Si la maladie est légèrement à modérément virulente, appliquer pour réduire la gravité de la tache des feuilles et de la fonte helminthosporienne causée par la <i>Drechslera</i> spp. (<i>Helminthosporium</i>) pathogène. Ne pas appliquer plus de trois (3) fois par saison.
Plaque estivale	103	30 jours	Appliquer à des fins préventives. Faire un premier traitement lorsque la température du sol à 5 cm de profondeur est supérieure à 16 °C pendant quatre jours consécutifs; faire un deuxième traitement 30 jours plus tard. Un troisième traitement peut être nécessaire en cas de temps chaud et humide. Appliquer de 13 à 21 L d'eau/100 m ² . Ne pas appliquer plus de trois (3) fois par saison.
Moissure rose et grise des neiges	206	Fin de l'automne	Faire un traitement à la fin de l'automne avant que la neige ne couvre le sol. Ne pas appliquer sur la neige ni quand la température est inférieure à 0 °C. Ne pas appliquer plus d'une (1) fois par saison.
Fusariose froide	51 à 103	30 jours	Appliquer à l'automne ou au début du printemps lorsque le temps est frais et pluvieux. Utiliser une dose supérieure uniquement si la maladie est virulente. Ne pas appliquer plus de deux (2) fois par saison.
Rhizoctone ocellé	77 à 103	Fin de l'automne	Faire un traitement à la fin de l'automne avant que la neige ne couvre le sol. Ne pas appliquer par-dessus une couche de neige. Ne pas appliquer plus d'une (1) fois par saison.

Directives de mélange

1. Remplir la cuve du pulvérisateur à la moitié ou aux trois quarts avec de l'eau.
2. Ajouter la quantité appropriée de Quali-Pro propiconazole 14.3 ME, puis remplir le reste de la cuve avec de l'eau.
3. Agiter suffisamment pendant le mélange et l'application pour maintenir une émulsion uniforme.

Toujours lire et suivre les instructions sur l'étiquette.

quali-pro.ca/fr/products/propiconazole-14-3-me